

医療機関ごとの実績（令和2年度）

集計対象 (令和2年4月～令和3年3月)	横浜市の救急隊が脳血管疾患を 活用して搬送した人数 ※	救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数												横浜市 の救急隊の搬送患者のうち、 t-TPA治療実施数	救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数																
		通年						上半期							下半期						脳動脈瘤クリッピング術	うち未破裂	脳動脈瘤コイル塞栓術	うち未破裂	開頭脳内血腫除去術	開頭外減圧術	血栓回収療法 ※2				
		うちTIA・脳梗塞と診断した人数		救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した患者のうち、医療機関で診断した人数		うちTIA・脳梗塞と診断した人数		うち脳出血と診断した人数		うち不明・その他と診断した人数		うちTIA・脳梗塞と診断した人数			うち脳出血と診断した人数		うち不明・その他と診断した人数		C	D								E	F	G	H
		A + C	B + D	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L															
済生会横浜市東部病院	295	122	87	68	50	13	4	1	54	37	16	1	0	13	29	11	31	24	40	28	30										
汐田総合病院	149	36	30	36	30	4	2	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0										
脳神経外科東横浜病院	840	395	302	187	150	35	2	0	208	152	51	5	0	30	31	17	40	29	30	2	67										
菊名記念病院	404	143	78	58	31	9	2	16	85	47	13	3	22	17	8	0	10	3	19	0	2										
横浜労災病院	303	115	86	59	44	13	2	0	56	42	13	1	0	0	11	5	30	14	11	7	27										
横浜新緑総合病院	372	146	109	65	48	11	6	0	81	61	18	0	2	24	34	10	21	13	26	10	50										
横浜新都市脳神経外科病院	679	293	200	134	97	26	2	9	159	103	45	3	8	55	42	34	134	94	14	12	91										
横浜総合病院	214	65	50	34	27	5	2	0	31	23	8	0	0	15	4	1	11	2	6	0	8										
昭和大学藤が丘病院	189	31	24	19	13	5	1	0	12	11	1	0	0	3	15	11	43	37	6	1	10										
昭和大学横浜市北部病院	201	146	36	71	23	3	0	45	75	13	1	0	61	1	12	10	25	18	11	6	11										
聖隷横浜病院	462	127	100	50	40	6	0	4	77	60	9	4	4	6	1	1	32	19	5	3	13										
横浜市立市民病院	333	54	43	43	32	9	0	2	11	11	0	0	0	19	9	0	13	6	27	3	32										
イムス横浜狩場脳神経外科病院	459	185	140	84	62	17	4	1	101	78	21	1	1	17	7	0	0	0	5	0	1										
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	128	49	38	17	13	4	0	0	32	25	4	3	0	9	21	16	8	5	3	0	10										
横浜旭中央総合病院	725	312	149	145	75	19	2	49	167	74	32	0	61	6	14	5	1	1	13	2	18										
上白根病院	114	76	22	45	12	2	0	31	31	10	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0										
横浜鶴ヶ峰病院	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0										
東戸塚記念病院	438	65	33	44	22	16	1	5	21	11	5	1	4	8	2	2	3	0	15	1	18										
横浜医療センター	413	173	127	74	58	14	2	0	99	69	30	0	0	37	67	42	27	20	20	0	47										
西横浜国際総合病院	47	14	10	10	8	2	0	0	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0										
国際親善総合病院	356	86	53	42	29	12	1	0	44	24	17	3	0	1	12	1	0	0	2	0	0										
横浜市立みなと赤十字病院	561	129	82	46	35	10	1	0	83	47	30	6	0	18	13	5	15	3	11	3	19										
横浜中央病院	214	46	39	16	14	2	0	0	30	25	5	0	0	1	4	2	3	1	3	0	0										
横浜市立大学附属市民総合医療センター	158	29	23	13	10	1	1	1	16	13	3	0	0	2	11	10	39	29	8	9	4										
済生会横浜市南部病院	510	49	6	49	6	17	8	18	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	2										
秋山脳神経外科病院	509	191	152	103	84	19	0	0	88	68	18	2	0	34	2	0	16	4	1	1	46										
磯子中央病院	69	18	16	8	7	1	0	0	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	765	350	242	170	121	35	3	11	180	121	42	4	13	46	18	10	26	16	12	14	44										
横浜市立大学附属病院	256	54	45	16	14	1	0	1	38	31	5	0	2	4	18	11	30	24	6	3	18										
横浜南共済病院	549	71	38	41	23	3	1	14	30	15	4	3	8	7	14	5	4	3	8	3	0										
横浜栄共済病院	459	134	98	54	35	18	1	0	80	63	17	0	0	6	11	5	27	9	6	5	19										
計	11,197	3,704	2,458	1,801	1,213	332	48	208	1,903	1,245	409	40	209	390	410	214	589	374	308	113	587										

◆ 令和2年度時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。

◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象としている。

※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。

※2 血栓回収用機器による治療が集計対象です。

治療実績（医療機関別 t-PA 治療前 NIHSS 及び 3 か月後の mRS）

No.	t-PA 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※ 3	3 か月後の mRS (障害の程度) ※ 4
1	15	4
2	22	3
3	27	4
4	8	4
5	3	4
6	12	3
7	3	1
8	24	1
9	7	0
10	8	1
11	5	3
12	40	6
13	15	4
14	18	4
15	11	4
16	9	0
17	7	1
18	17	0
19	5	3
20	9	1
21	10	0
22	10	1
23	9	0
24	1	0
25	13	1
26	31	6
27	2	0
28	27	4
29	4	0
30	18	2
31	4	1
32	27	5
33	6	1
34	5	1
35	8	6
36	18	3
37	26	6
38	22	0
39	3	1
40	5	4
41	8	2
42	5	3
43	9	0
44	11	0
45	26	6
46	6	1
47	26	6
48	15	2
49	22	5
50	21	6
51	26	1
52	21	2
53	18	1
54	21	5
55	21	5
56	15	2

No.	t-PA 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※ 3	3 か月後の mRS (障害の程度) ※ 4
57	19	4
58	8	4
59	13	1
60	15	4
61	17	4
62	4	1
63	2	1
64	3	2
65	3	1
66	4	0
67	26	4
68	15	4
69	8	2
70	12	3
71	10	3
72	3	0
73	6	0
74	22	1
75	22	4
76	18	3
77	9	4
78	4	0
79	9	1
80	15	1
81	5	0
82	11	4
83	14	4
84	38	4
85	12	1
86	29	6
87	20	2
88	23	2
89	28	4
90	23	2
91	13	5
92	25	0
93	14	0
94	13	0
95	17	1
96	25	6
97	18	4
98	10	5
99	7	0
100	15	1
101	4	4
102	25	0
103	18	2
104	2	0
105	19	0
106	22	2
107	8	3
108	1	0
109	18	0
110	6	4
111	4	1
112	4	4
113	23	1
114	6	1

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
115	10	1
116	16	4
117	20	4
118	3	2
119	27	5
120	7	3
121	2	0
122	21	5
123	24	0
124	2	0
125	28	0
126	36	4
127	22	3
128	14	3
129	2	0
130	18	4
131	12	3
132	8	4
133	12	1
134	16	5
135	9	1
136	24	1
137	17	1
138	9	4
139	16	5
140	8	0
141	14	1
142	30	5
143	26	0
144	24	4
145	8	4
146	20	5
147	21	4
148	8	4
149	24	6
150	16	5
151	14	5
152	15	4
153	12	5
154	15	6
155	18	6
156	29	6
157	22	4
158	26	6
159	5	2
160	5	0
161	25	5
162	0	1
163	7	2
164	24	5
165	25	4
166	4	0
167	13	0
168	34	6
169	13	1
170	3	0
171	17	5
172	11	1

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
173	5	2
174	19	1
175	28	6
176	5	0
177	3	1
178	14	1
179	14	0
180	10	6
181	13	4
182	12	6
183	16	4
184	16	4
185	4	4
186	10	1
187	7	4
188	9	4
189	0	1
190	2	3
191	23	4
192	16	1
193	13	1
194	26	1
195	3	4
196	25	6
197	26	5
198	29	5
199	13	0
200	16	2
201	7	3
202	30	5
203	5	2
204	26	4
205	4	2
206	14	5
207	4	2
208	38	6
209	1	2
210	2	4
211	4	2
212	3	1
213	4	1
214	17	3
215	10	3
216	21	4
217	7	4
218	9	2
219	1	0
220	6	1
221	31	4
222	30	5
223	4	2
224	3	1
225	6	2
226	27	1
227	17	4
228	8	4
229	9	4
230	25	0

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
231	12	1
232	13	4
233	22	0
234	17	1
235	20	5
236	6	0
237	19	4
238	8	2
239	7	1
240	19	4
241	18	2
242	17	2
243	13	0
244	30	1
245	6	0
246	20	0
247	20	4
248	10	0
249	27	0
250	4	0
251	27	5
252	7	1
253	6	4
254	24	1
255	26	0
256	6	5
257	2	0
258	29	4
259	5	3
260	14	0
261	13	5
262	21	4
263	14	1
264	7	2
265	6	4
266	35	6
267	31	1
268	7	1
269	40	5
270	21	5
271	7	5
272	2	1
273	15	1
274	7	2
275	12	2
276	15	1
277	6	0
278	1	0
279	4	1
280	3	1
281	20	2
282	26	2
283	8	2
284	10	0
285	8	3
286	11	4
287	6	2
288	19	5

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
289	3	1
290	2	3
291	1	0
292	6	0
293	30	4
294	5	1
295	5	0
296	17	1
297	20	0
298	20	1
299	8	1
300	8	4
301	19	3
302	6	2
303	8	0
304	15	0
305	12	0
306	26	0
307	19	4
308	7	3
309	6	3
310	9	4
311	16	0
312	7	0
313	8	4
314	3	2
315	14	1
316	9	3
317	32	4
318	26	3
319	3	2
320	24	0
321	9	4
322	8	3
323	11	1
324	22	5
325	15	4
326	15	3
327	21	0
328	24	4
329	33	3
330	19	5
331	2	1
332	16	2
333	5	0
334	14	2
335	17	2
336	8	1
337	18	2
338	4	1
339	13	-
340	4	-
341	10	-
342	1	-
343	7	-
344	2	-
345	1	-
346	11	-

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
347	4	-
348	1	-
349	21	-
350	3	-
351	6	-
352	25	-
353	6	-
354	3	-
355	8	-
356	1	-
357	2	-
358	4	-
359	12	-
360	-	-
361	1	-
362	3	-
363	12	-
364	3	-
365	-	-
366	5	-
367	8	-
368	2	-
369	14	-
370	17	-
371	2	-
372	9	-
373	17	-
374	27	-
375	19	-
376	22	-
377	23	-
378	12	-
379	11	-
380	16	-
381	11	-
382	16	-
383	8	-
384	7	-
385	22	-
386	15	-
387	32	-
388	23	-
389	7	-
390	10	-

※3 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。

症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

※4 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。